

İM AL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 16.12.2015/10438

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	
	Siriken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)	
	Balıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	
	Çobançeğniği (<i>Polygonum aviculare</i>)	
	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	
	Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)	
	Isırğan Otu (<i>Urtica urens</i>)	
	Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)	
Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
Fasulye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Çobançeğniği (<i>Polygonum aviculare</i>)	
	Siriken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)	
Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)		
Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)		
Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
Soya	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Sütlüoğan (<i>Euphorbia spp.</i>)	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Yapışkan ot	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	
	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	
Yerfıstığı	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)	
Yapışkan ot	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Çobançeğniği (<i>Polygonum aviculare</i>)	
	Çukurova fener otu (<i>Physalis angulata</i>)	
Domuz pıtrağı	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	100 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem. Ayçiçeğinin 4-10 yapraklı döneminde uygulanır.
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
Ayçiçeği (İM toleranslı çeşitler)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem. Ayçiçeğinin 4-6 yapraklı döneminde uygulanır.
	Horoziği (<i>Amaranthus albus</i>)	
	Kısr yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	
	Siriken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>)	
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
Zincir pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>)		
Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
Yonca	Siriken (<i>Chenopodium album</i>)	130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem. Ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde uygulanır.
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
	Canavar otu (<i>Orobancha cernua</i>)	
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>)		
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası. Yonca'nın 10-12 yapraklı döneminde uygulanır.



ONCROPSİENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

BANTOR ULTRA

Suda Çözülen Konsantre (SL)

Grup	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	-----	--------------------------------

40 g/l Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine $\frac{1}{4}$ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlara tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, Solunuma: Hastayı sakince, açık havaya çıkarınız.

Deri teması: Su ve sabun ile iyice yıkayınız.

Göz teması: Göz kapaklarını açık tutarak akan su altında en az 15 dakika süreyle etkilenen gözleri yıkayınız.

Yutulursa: Ağzınızı yıkayınız ve sonra bol su içiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

08 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :

İÇİNDEKİLER:

1) İmazamox 2) Sulu amonyak

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKELİ

ZARARLILIK İFADELERİ:

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H410: Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir.

ÖNLEM İFADELERİ :

P102 :Çocukların erişmeyeceği yerde saklayınız.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.

P273 :Çevreye yayılmasını önleyiniz.

P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNE veya doktoru/hekimini arayınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P501 :İçerik/ kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EU401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Uygulamalar yağsız ve sakın günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

ONC
ONCROPSİENCE KİM.SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Hayatlı Mah. 1. Kat No: 846/17-01 Yüreğir / ADANA
Tic Sic No: 154400 / Mers: 0322 459 78 02
E-posta: info@onc.com.tr / Web: www.onc.com.tr

M. Şükrü ABAY

Teknik Müdür

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmaktadır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BANTOR ULTRA yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur. İMİ Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: BANTOR ULTRA İMİ toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabans) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

BANTOR ULTRA uygulamasından sonra ekilecek bitkiler;

Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı

4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı, nohut, ayçiçeği, tütün

9 ay sonra: Mısır, patates, çeltik, pamuk

12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BANTOR ULTRA adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BANTOR ULTRA 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



ONCROPSİENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

BANTOR ULTRA

Suda Çözülen Konsantre (SL)

Grup	B,2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

40 g/l Imazamox

ÜRETİCİ FIRMA:

Nanjing Agrochemical Co., Ltd.
Nanjing Economic & Technology Development Zone
(11-Zitanyaju, 126 Mengdu Street, Nanjing, Çin)

ÜRETİM YERİ:

Shandong QiaoChang Modern Agriculture Co., Ltd.
South of Yongxin Road, Southeast of Qinhuangtai, Bincheng District,
Binzhou city, Shandong Province, 256600, Çin.

RUHSAT SAHİBİ FIRMA :

ONCROPSİENCE KİM.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı Gürpa Tohum Apt. No:846 / Z01
Yüreğir / ADANA / TÜRKİYE

Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax: 0 (322) 459 78 82



08 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.