KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dilüsyonu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
TÜRLÜ SEBZE	Yaz kırkıcısı (Phyllocnistis citrella) (Erginler)	25 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.), (ergin)	15 gün
	Yaprak bitleri türü (Myzus persicae vb.)	25 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.), (ergin)	
ELMA	Armut psillası (Cacopsylla pyri) (Yaprak bitleri)	10 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.), (ergin ve nimfler)	15 gün
	Mısır bitleri (Yaprak bitleri, elmacık bitleri)	25 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.), (ergin ve nimfler)	
KİRAZ	Bir önceki ürünün listesi / Yukarıdaki ürünler	25 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.),	—
****BAĞ**	Bir önceki ürünün listesi / Yukarıdaki ürünler	75 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.),	28 gün
ŞEFTALİ	Bir önceki ürünün listesi / Yukarıdaki ürünler	25 ml/100 L su (ruhsatlı ekol.),	14 gün

* Tarımsal İlaçlarla İlgili Diğer Kanun ve Mevzuatlar Hakkında Bilgi Verilmiştir.

**Üzüm'ün yanında bağ, nar yanında ise nar yazılacak. Diğer ürünlerde bu kısım boş bırakılacaktır.

ETİKET BİLGİSİNİN ÜRÜNÜNÜZÜN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Tavsiye dozu üzerindeki miktarda uygulama ÜRÜN zararlı organizmalarda direnç oluşturabilir. Ürünün tavsiye edildiğinden farklı bitkisel ürünlerde kullanılmasından doğacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanılmadan önce ürünün etiketini ve kullanım talimatını okuyunuz. Etiket ve kullanım talimatına uygun kullanılmayan ürünlerden doğacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı hatası olarak adlandırılan durumlardan firmamız sorumlu değildir. Ürünün etiketinde yer alan tüm uyarılara dikkat ediniz. **KULLANMAYINIZ:** Uygulamayı önerilenden daha yüksek veya daha düşük dozlarda, uygun olmayan zamanlarda, uygun olmayan bitkilerde ve uygun olmayan zararlılara karşı kullanmayınız. Bu durumlardan doğacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Uygulamayı yağmurlu veya rüzgarlı havalarda yapmayınız. Uygulamadan sonra ilaçlı suyun bulaştığı ekipmanları temizlemeden önce ve ilaçlama sonrası