KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Patates	Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)	21 ml/da Yarma	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BİÇİ önce aynı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarısı kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaken karışım deponun üzeri eklenir. Karıştırılması devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırıcı çalışmaya devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda uç tür kaplama sağlayacak şekilde belirli aralıkl verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar güneşli saatlerde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamalar tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu, güvenli bir şekilde boşaltınız. Deposu temiz su dolduralıktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kanalizasyon şebekesi veya sulama kanallarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurt/kara soğanlı seçilen 5 ilçe su uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt sonucu ve larvaları saydır ve 5 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

EMADOX SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22 A.S. olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **EMADOX SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını azaltınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip Grup 22 A.S. harici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Karışım yapmadan önce ilaç ile karışım testi yapılması önerilir.

EMADOX SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	22 A/S	İNSEKTİSİT (Blokör Ilaç)

106 g/l İndoksakarb + 53 g/l Emamectin benzoate

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürünlerini uygulamadan önce kullanma talimatını okuyunuz.
Kimlerin(ç. kişilerin) kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü önerisi uygulanmış olanlara 1 gün insan ve hayvan tüketmeyiniz.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün bos ambalajlarının üzeri üzerini delme kadar temiz su boşaltarak tekrar cullakonmiz. Çukulama suyunu uygulama makinesine deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ile belirtileri gözbebeklerinde bozulma, mideburukluk ve kusmada ihtema, ciddi olarak kusmuk sıfaşı olması.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunma: Temiz havaya çıkartınız. Muğdursu, sakin ve rahat bir şekilde tutunuz. Gerekirse tıbbi yardım alınız. Solu solunum reçlevesi derlenen gerekli olabilir.
Cilt ile temas: Kirlenmiş, olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve özl miktarda su ile iyicene yıkayınız. Deriniz tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görülüdüğü takdirde doktora başvurunuz. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.
Gözle temas: Kontak lenslerini varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarınız.
Sözleri açık kapakarak 20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice akan ılık suyla veya tuzlu solüsyonla yıkayınız. Gerekiyorsa tıbbi yardım alınız.
Yutulursa: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Doktor veya zehirlenme merkezi tarafından söylenmedikçe asla kusturmayınız. Kazazedeye bilinci açık ise: Ağzı suda çalkalayınız. Eğer kombüjyeden kusmu mevcuda getirse bazı seyreltmeye yardımcı olmak için daha fazla su içiniz.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Bilinen bir antidotu vakkız. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulana.

Net Miktarı:
Azami perakende Satış Fiatı (KDV Dahil):

İÇİNDEKİLER: % İndoksakarb 22 Emamectin benzoat

ZARARLIR İŞARETLERİ

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLIR İFADELERİ:
H410 - H400+H410 Çevrede çok toksik. Uzun etkili etkileri olan sudaki yaşamlar için çok toksik.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olur.
H318 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara neden olur.
H412 Sucul ortamda uzun etkili zararlı, çok etkili etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P280 Koruyucu/kullanıcı/göz/yüz koruyucu/koruyucu giysinin giyilmesini.
P273 Çevreye atılmasından kaçının.
P309+310 YUTULDUĞUNDA: DERHAL HEKİM/Tıbbi yardım alınız.
P305+P351 Göz tahriş halinde: Su ile dikkatlice yıkayın.
P337+P313 Göz tahriş devam ediyorsa tıbbi yardım alınız.
P260 Buharları/sis/gazları solumayın.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilere neden olmamak için, kullanma talimatına uyun.

KULLANIMININ VE DEPOLANMA ŞEKLİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER:
- Bitki koruma ürünü, sadece etiketinde belirtilen amaçlarda kullanılmalıdır.
- Ambalajın ve ilaçın uygun şekilde atılmalıdır. Kimsenin ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde bulundurmayınız.
- Bitki koruma ürününü çevreli olarak uygulama alanı dışındaki bitkilere zararlarının önlenmesi.
- Kuru ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Gıda, yem, gübre, ağaç ve ilaçlar ile birlikte taşınmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal şartlar ve kuru, serinlerde orijinal ambalajında sıcaklıktan korunarak depolanmalıdır. 2 yıl süre ile etki kaybına sebep olmadan kalır. Ambalajlar ve içindeki ürünler çocuklar, gıda, yem, gübre, ağaç ve ilaçlar ile birlikte taşınmamalıdır.

FİRMA BİLGİSİ:
Ürünün ambalajlanmasının yapılacağı kısım ile ürünün bitki koruma ürünlerinin kullanımı yapılacak yerlere. Ürünlerin tahlil sonucu ürünlerinin hatalı ürünlerinden meydana kaynaklanan ürünlerinin ambalajlarda ürünlerinin ambalajlarda ürünlerinin ambalajlarda