

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH VE NO'su :13.05.2019/11379

MARSON SC , mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir bitki koruma ürünüdür. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır , otlarda gelişim durur yapraklar kırmızı mor renge döner.15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşa rizomları etkiler ,yeni sürgün vermelerini önler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son uygulama ile hasat arasında ki süre (Gün) |
|---------------------|---|---|---|
| *MISIR (4-8 Yaprak) | Çimensi Yabancı otlar Benekli dancan (<i>Echinochica colonum</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Yeşil Kirpidarı (<i>Setaria viridis</i>) | 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2 - 6 yaprak) | 56 |
| | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 125 ml/da Bitki koruma ürününü bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) | 56 |
| | Geniş Yapraklı Yabancı otlar Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Yabani Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) | 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerinde | 56 |

*Tatlı mısır ve Cin mısır'da kullanmayınız.

Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde Bromoxynil terkipli bitki koruma ürünleriyle karıştırıldığında etki artar (Bromoxynil: 100 ml/da). Ayrıca aynı (*Cynodon dactylon*) ve topalak (*Cyperus sp.*) otlarını da baskı altında tutar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmesi meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.



ONCROPSCIENCE Kimya San. Ve Tic.Ltd. Sti.,

MARSON SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| | | |
|-------|-----|-------------------------------|
| GRUBU | B,2 | HERBİSİT (Yabancıot İlacı) |
|-------|-----|-------------------------------|

40 g/l. Nicosulfuron

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ, İNSAN VE HAYVAN GIDA MADDELERİNDEN UZAK YERLERDE DEPOLAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINCA YOKTUR.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

TARIM VE ÇEVRE BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Şubat 2022

(Handwritten signature)

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV dahil) :
İÇİNDEKİLER: Nicosulfuron, Calcium dodecylbenzene sulphonate
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P391 Döküntüleri toplayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
-Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Uygulamadan sonra kullandığınız uygulama makinesini iyice yıkayınız.
-Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
-Uygulamadan sonra herhangi bir şey yiyip içmeden, sigara kullanmadan önce ellerinizi ve bitki koruma ürününe maruz kalmış vücut kısımlarını yıkayınız.

ONCROPSCIENCE İLAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Havuzlu Mah. Karşıyaka Bulv. No: 846 İZ - 01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 62 - Faks: 0322 459 78 62
E-Posta: M.D. 6430351160

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı betirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

-Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

-Uygulamadan sonra 4-5 saat yağış olmamalıdır.

-Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız mısır gelişimi etkilenir. Yapıktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

Münavebede Dikkat Edilecek Hususlar:

MARSON SC uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday, arpa, soya fasulyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MARSON SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MARSON SC 'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Organik fosforlu bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ONCROPSCIENCE Kimya San. Ve Tic.Ltd. Sti.,

MARSON SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

| | | |
|-------|-----|-------------------------------|
| GRUBU | B,2 | HERBİSİT (Yabancıot İlacı) |
|-------|-----|-------------------------------|

40 g/l. Nicosulfuron

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Soluma: Açık havaya çıkarın. Nefes alma düzensizse ya da durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat tutun. Derhal doktoru ya da Zehir Kontrol Merkezini arayın.

Deri teması: Derhal kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Bol miktar suyla derhal yıkayın. Eğer deri tahrişi sürerse, doktoru arayın. Tekrar kullanmadan önce bulaşmış kıyafetleri yıkayın.

Göz teması: Derhal bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil en az 15 dakika boyunca yıkayın. Kontak lensleri çıkarın.Acil tıbbi yardım alınması önerilmektedir.

Yutma: Yutulduğunda derhal tıbbi yardım alın ve kabını veya etiketi gösterin. Kusmaya teşvik etmeyin.

Tıbbi yardım: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

GÜNER TAR.MÜH.GIDA HAYV.ve İNŞ.TAAH.TUR. SAN.ve TIC.LTD.ŞTİ.

Bor Karma Org.San. Böl.2 Nolu yol 14. Cadde
No:1Bor/NİĞDE/TÜRKİYE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ONCROPSCIENCE KİMYA SAN. VE TIC.LTD. STI.,
Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı Gürpa Tohum Apt.
No:846 / Z01 Yüreğir /Adana/ TÜRKİYE

ONCROPSCIENCE KİM. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
Havutlu Mah. Karataş Bulvarı No:846 / Z01 Yüreğir / ADANA
Tel: 0322 459 78 81 - 82, 0322 459 78 82
Yürürlük No: 6430381160

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Şubat 2022

