KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
*PAMUK	Yeşilkurt *(Helicoverpa armigera)*	150 ml/da (Larva)	7 gün
ELMA	Elma içkurdu *(Cydia pomonella)*	20 ml/100 l su Larva	3 gün
**BAĞ	Bağ salkım Güvesi *(Lobesia botrana)*	20 ml/100 l su Larva	7 gün
	Bağ maymuncuğu *(Otiorrynchus spp.)*	25 ml/100 l su Larva	
MISIR	Bozkurt *(Agrotis spp)*	50 ml/da Larva	14 gün
	Mısır koçankurdu *(Sesamia spp.)*	30 ml/da Larva	
	Mısır kurdu *(Ostrinia nubilalis)*	30 ml/da Larva	
PATATES	Patates böceği *(Leptinotarsa decemlineata)*	40 ml/da	3 gün
	Bozkurt *(Agrotis spp.)*	40 ml/100 L su	
ŞEKER PANCARI	Pancar piresi *(Chaetocnema sp.)*	25 ml/da (Ergin)	3 gün
DOMATES	Yeşilkurt *(Helicoverpa armigera)*	50 ml/da (Larva)	3 gün
FINDIK	Fındık kurdu *(Curcilio nucum)*	50 ml/da Ergin	7 gün
LAHANA	Lahana yaprakgüvesi *(Plutella maculipennis)*	25 ml/da (Larva)	2 gün
HUBUBAT	Kımıl *(Aelia rostrata)*	45ml/da Kışlanmış ergin 2. Ve 5.Dönem nimf ve yeni nesil ergin. 1-3 dönem nimf 50 ml/da Larva dönemi yeşil aksam uygulaması	14 gün
	Ekin Kambur Böceği *(Zabrus spp.)*	20 ml/da Satıh uygulaması	
ZEYTİN	Zeytin güvesi *(Prays oleae)*	15 ml/100 L. su	3 gün
	Zeytin sineği *(Bactrocera olea)*	30 ml/100 L. su çiçek nesli	
	Zeytin karakoşnili *(Saissetia oleae)*	30 ml/100 l su (larva)	
	Zeytin pamuklubiti *(Euphyllura olivina)*	30 ml/100 l su	

* **Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.**
****Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz**
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü ayrı gün günde kullanınız.
KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Pamukta yeşilkurta karşı: rastgele seçilen 5 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 5 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir. **Elma içkurduna karşı:**Elma içkurduna yaplacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. **Bağ salkım güvesine karşı:** salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1040 gün-derece ulaşmak, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde taflanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır. **Mısır koçan kurdu ve Mısır kurduna karşı:** İlk sumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile iki uygulama daha yapılır. **Patates böceğine karşı:** Günlük ortalama sıcaklık 14-15 oC' ya ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. Birinci dölle karşı uygulama uygulması durumunda ise sumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de bitcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40' a kadar çıkmaktadır.
Buğday: İlkin kamburböceğine karşı: Tüyü ikaclaması yapılır. **Domateste yeşilkurta karşı:** Tarlaya köşegenler yönünden girilip,tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak,sap,meyve ve sürgünlerinde,yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuşsa derhal mücadeleye geçilir. **Lahana yaprak güvesine karşı:** Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir. **Zeytin güvesine karşı:** Zararlının çiçek döllünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu ellarda mevsim başında yaprak ve veni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek döllünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çıçek döllüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve döllüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'ninda canlı "yumurta+larva " olduğunda ilaçlama yapılır. **Zeytin karakosniline karşı:** Uygulama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm'lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi kosnile ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50'nin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90'nın açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının % 50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlıara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıy bazılı altına alağından, bir uygulama yeterlidir.
DİĞERİ İLE İLİŞKİ BİLGİ: NINJITSU CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir İnsektisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **NINJITSU CS'** nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

NINJITSU CS

KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

50 g/l Lambda-cyhalohtrin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel belirtiler; başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve isha ldir. İlaç ile temas, deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Gözle teması halinde: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın
Ciltle teması halinde: Derhal sabun ve su ile yıkayın. Doktora başvurun.
Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.
Yutulması halinde: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Hastayı kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme anında zehir danışma merkezine başvurunuz.

Net Miktarı:

Azami perakende Satış Fiatı (KDV Dahil):

İÇİNDEKİLER: Lambda-cyhalohtrin

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

UYARI KELİMESİ : TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ:
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P301+310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya hekimi arayın.
P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Havuzları, nehirleri ve suyollarını bitki koruma ürünleri ve boş ambalajla kirletmeyiniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler, ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:
Agrow Allied Ventures Pvt.ltd.
C 1/9 DLF PHASE-1, GURGAON-122002 (HARYANA),INDIA
Fabrika: SP 3-7/(B), Industrial Area, Keshwana, Tehsil-Kotputli, Distt. Jaipur, Rajasthan, Hindistan
RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
ONCROPSCİENCE Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Havutlu Mahallesi Karataş Bulv. Gürpa Tohum Apt. No:846/201 Yüreğir / Adana/ Türkiye
Tel: 0 (322) 459 78 81 Fax:0 (322) 459 78 82
www.oncropscience.com.tr

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'su : 22.11.2018 / 11258

ONCROPSCİENCE
Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114