

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
*BAĞ	Hağ Mıdyesi (<i>Phoma sp. viticola</i>)	75 ml/100 l su	21 gün
	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)		
HIYAR	**Ölü Kök (<i>Phoma sp. viticola</i>)	75 ml/100 l su	5 gün
	Kabukçilerde Külleme (<i>Erysiphe chalaranana, Sphaerotheca fuliginea</i>)		
KABAX	Kabukçilerde Mıdye (<i>Phaeodactylopusia cubensis</i>)	40 ml/100 l su	5 gün
	Kabukçilerde Külleme (<i>Erysiphe chalaranana, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 l su	5 gün
DOMATES (TARLA)	Mıdye (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml/100 l su	5 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solana</i>)		
KARPUZ	Alternaria Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml/100 l su	5 gün
BİBER (SERÂ)	Külleme (<i>Erysiphe bisonica</i>)	75 ml/100 l su	5 gün
ÇELTİK	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100 ml/ta	28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasatı yapılacak bağ alanlarında kullanılmasın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Her türlü tarım, bahçecilik, evcil hayvan besiciliği için kullanılacak bitki koruma ürünleri, kullanılmadan önce etiket ve kullanım talimatları dikkatle okunmalı ve talimatları dikkatle okunmalıdır. Ürünleri kullanmadan önce etiket ve kullanım talimatları dikkatle okunmalıdır. Ürünleri kullanmadan önce etiket ve kullanım talimatları dikkatle okunmalıdır. Ürünleri kullanmadan önce etiket ve kullanım talimatları dikkatle okunmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesi ölçülebilir ölçümlerle kalibrasyon yapılmalıdır. Ölçülebilirler için kalibrasyon yapılmalı, ölçülebilirler için kalibrasyon yapılmalı. Ölçülebilirler için kalibrasyon yapılmalı, ölçülebilirler için kalibrasyon yapılmalı. Ölçülebilirler için kalibrasyon yapılmalı, ölçülebilirler için kalibrasyon yapılmalı.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulama makinasının temizliği, kullanılmadan önce yapılmalıdır. Kullanılmadan önce yapılmalıdır. Kullanılmadan önce yapılmalıdır. Kullanılmadan önce yapılmalıdır. Kullanılmadan önce yapılmalıdır.

BAG MİDYE: 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. 20-30 ml/m² toprakta uygulanır. 20-30 ml/m² toprakta uygulanır. 20-30 ml/m² toprakta uygulanır. 20-30 ml/m² toprakta uygulanır.

BAG KÜLLEMESİ (Erysiphe necator): 1. uygulama: Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. 2. uygulama: Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. 3. uygulama: Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. 4 ve 5. uygulama: Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır.

BİBER (SERÂ) KÜLLEMESİ: Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır.

KARPUZ ALTERNARIA YAPRAK YANIKLIĞI: Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır.

ÇELTİK YANIKLIĞI (HASTALIK): Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır. Ürünler 0.5 kg/m² toprakta uygulanır.

DİĞER BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİYLE KARŞILIKLILIK DURUMU: ONADRİS SC, diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

ONADRİS SC, diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

ONADRİS SC, diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

ONADRİS SC, diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

ONADRİS SC, diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

ONADRİS SC, diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

ONADRİS

SC

AKICI KONSANTRE (SC)

GRUP

C3;11

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

250 g/L Azoxystrobin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN buhar ve/veya zerrelerini tenefüs etmeyiniz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN uygulanması sırasında sigara içmeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatını okuyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının içine 1/4 litre kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama süyümü ilacın tamamına baltasına baltanınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Önemli miktarda bütüveye alınmasını takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte iştah görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Yutulursa: Yutulmuşsa, hemen tıbbi yardım isteyiniz ve ürünün etiket ve ambalajını gösteriniz. Hastayı kusturmuyunuz.

Gözlere teması: Hemen bol su ile asgari 15 dakika göz kapagı dahil gözleri iyice çalkalayınız. Kontak lens kullanılmıyor ise, çıkarınız. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

Çilde teması: İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkarınız, bulaşık yerleri hemen bol su ile yıkayarak temizleyiniz. Çilt tahrişli kalıcı ise, doktora başvurmanız gerekir. İlaçla bulaşık giysileri tekrar kullanılmadan yıkayınız.

Solumun yoluyla: Temiz havaya çıkın. Solumun düzensiz yahut durmuş ise, suni tenefüs uygulayınız. Hastayı sıcak tutarak, istirahat ettiriniz. Doktor çağırın veya Hemen Zehir Danışma Merkezine arayınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidözü yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mıdye, mide muhteviyatının solumun yoluyla kaçırılmasına dikkat ederek yıkayınız. Mangal kömürü ve bir miktar ilacı yeriniz. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

Net Miktar:

Azami perakende

Satış Fiyatı (KDV Dahil):

İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin, İnyeye gırtlak Kılıfında yapraklı ve sulfitlere duyarlıdır.

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ : TEHLÜKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Mıdyeye halinde zararlıdır.

H315 Çilt tahrişli olabilir.

H319 Çabuk göz tahrişine yol açar.

H331 Solumun yoluyla tahriş edicidir.

H410 Sulfit içeren ürün suya kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişiminden uzak tutunuz.

P273 Çevreye salınmasını önleyiniz.

P280 Koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/göz koruyucu/veya koruyucu kullanınız.

P311 ZEHİR MERKEZİNE veya doktorunuza başvurunuz.

P403+P233 Islak tutulmamalıdır. Her durumda deriyi koruyunuz. Kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

PS01 İçerdiği/taahhüt ettiği alkali tertemiz leşenle tertemiz ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri azaltmak için, kullanım talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıbağlı alanlarda, sulfit bulundurmaz.
- Ateşe tutulmaz, çalkalama işlemi kullanılmayabilir.
- Boş ambalajları koruyucu bulaşık su ile yıkanmalıdır.
- Aktarıcı koruyucu, havuz, çeşme vb. alanlarla ve akarsularla dökmeyiniz.
- Kullanılmayan bitki koruma ürününü, ambalajı içinde, açığa çıkıca kapalı tutunuz, kilitli tutunuz saklayınız.
- Bulaşık su ile ekolojik ortamı ve suyu temizlemek için kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal şartlar ve kurdu şartları dışında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir değişimle sonuçlanmayacak bir depolama süresi vardır. Orijinal ambalajlarında tutulmuş kalıcı ise, emülsiyon bitki koruma ürünlerini kalıcıdır garanti edemez. İmalatçıları bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya taşıması meydana gelen riskleri konusunda bilgi sağlamak için sorumlu kabul etmezler.

ÜRETİCİ FIRMA ADI ADRESİ: HOK (ZHANGZHOU) BIOSCIENCE INC.

Room 502, Building L, No.88 Wanyue Street, Nanxian Street, Fuzhou District, Hangzhou City, Çin

ÜRETİM TEŞİSİ ADI ADRESİ: YONGNONG BIOSCIENCES CO. LTD.

Nanxian, Guo Economic and Technology Development Zone, Shaoxing, Zhejiang, Çin

RUHSAT SAHİBİ FIRMA ADI ADRESİ: ONCROPS SCIENCE Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Hacıhalı Mahallesi Karaköy Bulvarı, Göksu Tarım Apt. No:46/201 Yanyol / Adana / Türkiye

Fon: 0 (322) 459 79 81 Fax: 0 (322) 459 79 82

www.oncropscience.com.tr

İMAL TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ
SARFI NO
RUHSAT TARİH VE NO'SU

04.01.2016/19745

04.01.2016/19745



ONCROPS SCIENCE
Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114