

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO'SU : 17.12.2015/10437

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki veya kullanım alanının adı	Kontrol ettiği yabancı otlar	Kullanım Dozu Ve Dönemi
Bağ*	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml / da Köpek dişi 15-20 cm, Kanyaş 2-3 kardeşle iken
Domates	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml / da Domatesler 15-20 cm boyda, Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, çıkış sonrası
Ayçiçeği	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Brom (<i>Bromus spp.</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabani arpa (<i>Hordeum spontaneum</i>) Yabani dan (<i>Panicum spp.</i>) Çayır püsküllü (<i>Poa spp.</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml / da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası
Soğan	Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan danı (<i>Setaria spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml / da Soğan 15-20 cm boyunda iken, Kanyaşların 3-5 yapraklı Dancan ve Yapışkan danları 10-15 cm boyunda oldukları dönemde
Kırmızı Mercimek	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml / da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası
Kırmızı Mercimek	Ayrık (<i>Elymus repens</i>)	100 ml / da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası
Şeker Pancarı	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75-100 ml / da Yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	75-100 ml / da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya Fasulyesi	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kusyemi (<i>Phalaris spp.</i>) Yabani danı (<i>Panicum spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml / da Yabancı otlar 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası
Kanola	Delice (<i>Lolium temulentum</i>)	200 ml / da, çıkış sonrası
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kusyemi (<i>Phalaris spp.</i>) Çayır püsküllü (<i>Poa spp.</i>) Yapışkan danı (<i>Setaria spp.</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml / da, çıkış sonrası
Nohut	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml / da, çıkış sonrası



Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

SİNO 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	A1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	----	-----------------------------

50 g/l Quizalofop-P-ethyl

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, bulanık görme. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Solunması halinde: Eğer zehirlenme belirtileri açıkça görünüyorsa, Zehirlenme Bilgi Merkezine başvurun veya derhal bir doktora başvurun.

Ciltle teması halinde: Bulaşmış olan kimyasal ürün tamamen temizlenene kadar, yaklaşık 10-20 dakika arası, kimyasal bulaşmış bölge ılık su ile yıkanmalı, Eğer tahriş devam ediyorsa su ile yıkanmaya devam etmeli ve bir doktora başvurulmalıdır.

Gözle teması halinde: Bulaşmış olan kimyasal tamamen çıkana kadar, gözler dikkatlice 20 dakika boyunca, göz kapakları açık bir biçimde yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Kazazedenin ağzını bol su ile çalkalayın. Kazazedenin kusması için zorlamayın. Derhal doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Mayıs 2019

NET MİKTARI :
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

İÇİNDEKİLER:

- 1 Quizalofop-p-ethyl
- 2 Calcium dodecylbenzene sulfonate
- 3 Ethoxylated fatty alcohol
- 4 Solvent naphtha

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
- P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz ve sigarada içmeyin.
- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
- P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN ve DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Depoda başka bitki koruma ürünleriyle karışmasına mani olunuz.
- Ürünün hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- Boş bitki koruma ürün kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

ONC
ONCROPS SCIENCE KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Hayatlı Mah. Karataş Bulv. No: 146/21 / Çarşı / ADA
Tel: 0322 459 78 81 Fax: 0322 459 78 82
Yatırım No: 6430381160

M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür



Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmayacaktır.
Zah N



Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

SİNO 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	A1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
------	----	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-P-ethyl

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirtilir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir). Otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta yapılmamalıdır. Tohumlarla temas ettirmeyiniz. Buğdaygillere karşı fitotoksiktir. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

SİNO 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SİNO 5 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Mayıs 2019



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, No.8, Lengjing Street, Ningbo
315010, Zhejiang, Çin.

ÜRETİM YERİ:

Shaanxi Hengtian Biological Agriculture Co., Ltd.
Dali Core Zone, Weinan National Agricultural Science and
Technology Park Çin.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Havutlu Mahallesi Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt. No:846 /
Z01 Yüreğir /Adana/ Türkiye
Tel:0 322 459 78 81 Fax:0 322 459 78 82



M. Şükrü ABAY
Teknik Müdür