

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| BİTKİ ADI | Zararlı organizma adı | Uygulama dozu ve dönemi |
|------------------|--|--|
| BAĞ | Köpek dişi ayrığı (Erodium cicutarium) | 100 ml / da |
| | Karıyık (Scirpium halimense) | Köpek dişi 15-20 cm, Karıyık 2-3 kademeli iken |
| DOMATES | Köpek dişi ayrığı (Erodium cicutarium) | 100 ml / da - Domatesler 15-20 cm boyda, |
| | Dancan (Echinochloa crus-galli) | Yabano otlar 5-6 yapraklı olduğunda, otlar sonrası |
| AYÇİÇEĞİ | Karıyık (Scirpium halimense) | 100 ml / da |
| | Tilkıkuşuğu (Alopecurus myosuroides) | Avuçları ve yabano otlar 3-4 yapraklı olduğunda, otlar sonrası |
| SOĞAN | Birni (Eleusine sp.) | 100 ml / da - Soğan 15-20 cm boyunda iken, |
| | Köpek dişi ayrığı (Erodium cicutarium) | Karıyıkların 3-5 yapraklı, Dancan ve Yapraklı danlar 10-15 cm boyunda oldukları dönemde |
| KIRMIZI MERCİMEK | Tilkıkuşuğu (Alopecurus myosuroides) | 75 ml / da |
| | Kor yabano yulaf (Avena stricta) | Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabano otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde otlar sonrası |
| KIRMIZI MERCİMEK | Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare) | 100 ml / da - Mercimek 8-12 cm boyda iken, |
| | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | yabano otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde otlar sonrası |
| SEKER PANCARI | Arnik (Elymus repens) | 100 ml / da - Mercimek 8-12 cm boyda iken, |
| | Tilkıkuşuğu (Alopecurus myosuroides) | yabano otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde otlar sonrası |
| PAMUK | Yabano yulaf (Avena stricta) | 75-100 ml / da |
| | Piskilli çayır (Eleusine indica) | Tilkı yabano otlarında dokuz dokuz, çok tilkı yabano otlarında yedek dokuz uygulanır. |
| SOYA FASULYESİ | Piskilli çayır (Eleusine indica) | 75-100 ml / da - hasatından önceki dönemde, tohumdan önceki dönemde yedek dokuz uygulanır. |
| | Dancan (Echinochloa crus-galli) | |
| KANDLA | Karıyık (Scirpium halimense) | 100 ml / da |
| | Tilkıkuşuğu (Alopecurus myosuroides) | Yabano otlar 3-6 yapraklı olduğunda, otlar sonrası |
| NOHUT | Karıyık (Scirpium halimense) | 200 ml/da, otlar sonrası |
| | Tilkıkuşuğu (Alopecurus myosuroides) | 100 ml/da, otlar sonrası |

*Tüketicinin amacı bu yapıları hasadı yapılacak alanlarında kullanmamaktır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Önce ilave sınırlanmış alanların bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaba ve sonra diğer kaba ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposuna yabano otlar ve diğer bitkiler, makinesinin karıştırıcı çubuğu ile karıştırılır. Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaba ve sonra diğer kaba ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposuna yabano otlar ve diğer bitkiler, makinesinin karıştırıcı çubuğu ile karıştırılır. Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaba ve sonra diğer kaba ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposuna yabano otlar ve diğer bitkiler, makinesinin karıştırıcı çubuğu ile karıştırılır.

KALIBRASYON: Uygulama döneminde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İkinci kullanımdaki bu makineyi test etmeden önce kullanılmadan önce kalibrasyonu yapmalıdır. İkinci kullanımdaki bu makineyi test etmeden önce kullanılmadan önce kalibrasyonu yapmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulama sonrası makinesinin temizliği yapılmalıdır. İkinci kullanımdaki bu makineyi test etmeden önce kullanılmadan önce kalibrasyonu yapmalıdır. İkinci kullanımdaki bu makineyi test etmeden önce kullanılmadan önce kalibrasyonu yapmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

ÖZEL YARDIM TEDBİRLERİ: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

KARISILIRLIK DURUMU: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

ÖZEL YARDIM TEDBİRLERİ: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

KARISILIRLIK DURUMU: Bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır. Uygulamada bitki koruma ürünü yabano otları 3-4 yapraklı olduğunda ve herbifisitler için kullanılır.

SİNO

5 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP

A1

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

50 g/l Quizalofop-P-ethyl

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz,

İçmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama makinesinin deposuna boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, bulantı görme. Diğer zararlı belirtileri "Zararlı İfadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Soluması halinde: Eğer zehirlenme belirtileri açıkça görünüyorsa, Zehirlenme Bilgi Merkezinine başvurun veya derhal bir doktora başvurun.

Ciltle teması halinde: Bulanmış olan kimyasal ürün tamamen temizlenene kadar, yaklaşık 10-20 dakika arası, kimyasal bulanmış bölge ilk su ile yıkanmalı, Eğer tahris devam ediyorsa su ile yıkanmaya devam etmeli ve bir doktora başvurulmalıdır.

Gözle teması halinde: Bulanmış olan kimyasal tamamen çıkana kadar, gözler dikkatlice 20 dakika boyunca, göz kapakları açık bir biçimde yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Kazazedinin ağzını bol su ile çalkalayın. Kazazedinin kusması için zorlamayın. Derhal doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

Net Miktar:

Azami perakende

Satış Fiyatı (KDV Dahil):

İÇİNDEKİLER: 1) Quizalofop-o-ethyl 2) Calcium dodecylbenzene sulfonate 3) Ethoxylated fatty alcohol 4) Solvent naphtha

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ - TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevli sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Solumaya veya yutulmaya ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Uzun süreli göz hasarına yol açar.

H410 Sulak ortamlarda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çoakların ememesine engel olunmalıdır.

P210 Isıdan/ateşten/alevlerden/ısıcağ yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin.

P264 Eldivenlerden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigarada içmeyin.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNE veya doktora/hekime başvurun.

P380 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaşmamalıdır.
- Anlarsa zehirlidir. Gözle teması zamanı kullanılmamalıdır.
- Depoda başka bitki koruma ürünleriyle karıştırmaya mani olunuz.
- Ürünün hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- Boş bitki koruma ürün kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolanmalıdır. 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir değişim meydana gelmez.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile üreticiler bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Üreticiler bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyeleri uymadıkları eşiklikler neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA: Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.

Room 10-6, Shadi Square, No.8, Jengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang, CN.

ÜRETİM TESİSİ: Shanshi Henglian Biological Agriculture Co., Ltd.

Dali Core Zone, Western National Agricultural Science and Technology Park CN.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: ONCROPS SCIENCE Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Revitalite Mahallesi Karatopuk Bulv. Güzne İhsan Apt. No:845/201 Yüreğir / Adana / Türkiye

Tel: 0 (322) 459 78 81 Faks:0 (322) 459 78 82

www.oncropscience.com.tr



ONCROPS SCIENCE
Kim.San.Tic. Ltd. Şti.

İMAL TARİHİ :
SÜRE KULLANMA TARİHİ :
SARFI NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 17.12.2015/10457