

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİH VE NO :07.09.2016/10756

### KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu Ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Armut	Armut psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	100 ml/ 100 l su nimf	21 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	50ml/100 l su nimf ve ergin	21 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	75 ml/100 l su nimf ve ergin	21 gün
	Dut kabuklubiti ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	75 ml/100 l su larva	
Marul	Yaprakbitleri Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> ) Pamuk yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> ) Marul yaprakbiti ( <i>Nasonovia ribisnigri</i> )	75 ml/da nimf ve ergin	7 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

25 Temmuz 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

# VENİTRO 100 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	İNSEKTİSİT(Böcek ilacı)
-------	----	-------------------------

100 g/l Spirotetramat

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solum:** Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

**Deri teması:** Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glükol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

**Göz teması:** Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz.

Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

**Yutma:** Ağzı çalkalayınız. Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

### Antidodu ve Gerekli Bilgiler

Belirtilen spesifik bir antidodu yoktur semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKİZİ (UZEM) TEL: 114

  
**Dr. Yunus BAYRAM**  
Genel Müdür Yardımcısı

NET MİKTARI :

Azami perakende satış fiyatı:  
İÇİNDEKİLER: 1) Spirotetramat 2) Etylen glycol  
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ :

- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
  - H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
  - H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
  - H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
  - H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
  - H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki .
- ### ÖNLEM İFADELERİ:
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
  - P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.
  - P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
  - P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
  - P501 İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
  - P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
  - EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyun.
- ### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Artılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz. Boş ürün ambalajını başka bir amaç için kullanmayınız. Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muafaza ediniz. Uygulama esnasında genel korunma tedbirlerine uyunuz.

  
ONCROPSCIENCE KİM. SAN. VE TİC. LTD. STİ.  
Harvutlu Mah. Karataş Bulv. No: 844 / Z-51 Yüreğir / ADANA  
Tel: 0322 458 78 81 / Fax: 0322 458 78 82  
- Yürürlük No: 6430381160  
**M. Şükrü ABAY**  
Teknik Müdür



Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

# VENİTRO 100 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

100 g/l Spirotetramat

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin % 15 ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir ilaçlama yeterli olabilir

Elma yeşil yaprak bitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarını belirmesinden popülasyonun ¾'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı ilaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk tavra çıkışında bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Marulda yaprak bitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde ilaçlama yapılır. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalarının etkinliği dikkate alınmalıdır.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

VENİTRO 100 SC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için VENİTRO 100 SC aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## Karışılabilirlik Durumu

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde doğacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Oncropscience Kimya San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Havutlu Mahallesi Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt. No:846/201

Yüreğir/Adana/ Türkiye

Tel:0 322 459 78 81 Fax:0 322 459 78 82

info@oncropscience.com.tr

## ÜRETİCİ FİRMA:

GÜNER TAR. MÜH. GIDA HAYV. ve İNŞ. TAAH. TUR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bor Karma Org. San. Böl. 2 Nolu yol 14. Cadde No:1 Bor/NIĞDE

Tlf:0 388 315 00 82-0 388 315 00 83



M. Şükrü ABAY

Teknik Müdür

25 Temmuz 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

